

Sortstabel vinterrug

	Kerneudbytte forholdstal				Merudb. Svampebek (hkg/ha)	Hektolitervægt (kg/hl)	Råprotein i ts (%)	Foder-værdi, svin (kar. 1-9)	Strållængde (cm)	Lejesæd (kar. 0-10)	Type af sort	Fremavlsareal ha (Basis+C1+C2)	Modtagelighedsgruppe			Forædler/repræsentant
	Gns.	2019	2018	2017									Meldug(kar. -1-4)	Skoldplet(kar. 0-4)	Brunrust(kar. 0-4)	
KWS Receptor	105	105			14,1	76,5	8,7		138	1,9	Hybrid			2	3	KWS
KWS Jethro	105	105			10,9	76,3	8,9	5	140	0,6	Hybrid	174		2	2	KWS
KWS Tayo	104	104			5,7	75,8	9,2	5	133	1,8	Hybrid	384		2	2	KWS
KWS Serafino	104	103	101	107	9,6	75,7	8,9	6	141	2,6	Hybrid	689	0	2	2	KWS
KWS Berado	103	103			9,6	77,1	8,8		133	1,1	Hybrid	110		2	2	KWS
SU Arvid 90+10% population	103	98	108		16,5	75,2	9	6	136	0,5	Hybrid			2	2	Saaten Union
KWS Vinetto	102	100	101	104	12,4	76,5	9,3	4	132	0,6	Hybrid	416	2	2	2	KWS
KWS Livado	100	101	100	100	9,5	76,1	9,5	4	138	1,9	Hybrid	374	1	2	2	KWS