

TILVÆKST Grovfoder nr. 3, 5. marts 2026

Udgivet d. 05-03-2026

Indhold

Mark

Forårsgennemgang af græsmarker
Etablering af græsmarker i renbestand
Etablering af græsmarker i dæksæd
Etablering af hestebønner og ærter
Nitrifikationshæmmer i gylle til græs
Gylleanalyser 2026

Regler og tilskud

Sprøjtejournal – kom godt i gang
Sprøjtearbejdet udført af anden part – husk dokumentation
Flydende ammoniak må fortsat anvendes

MARK

Forårsgennemgang af græsmarker

Af planterådgiver Thomas Harbo

Græsmarkerne bør gås igennem og vurderes i det tidlige forår, når væksten er begyndt.

Plantetal og isåning

Kravene til plantetæthed i græsmarken er forskellige, alt efter om marken skal bruges til slæt eller afgræsning, og hvorvidt de
en bestand af hvidkløver eller ej. Der skal være tættest plantebestand, hvor der ikke findes hvidkløver i afgrøden.

Tabel 1 Minimum plantetal i græs- og kløvergræsmarker

Type / anvendelse		Produktive planter, krav til plantetal
Omdrift	Slæt	20-25 produktive planter pr. meter sårække (60-80 planter pr. ¼ m^2)
	Afgræsning	30-40 produktive planter pr. meter sårække (60-80 planter pr. ¼ m^2)
Vedvarende græs	Slæt	50-75 planter pr. ¼ m^2
	Afgræsning	75-100 planter pr. ¼ m^2

Vurderingen af den enkelte mark afhænger dels af, om det forventede udbytte kan nås og dels af din beholdning af græsens
Afgrøden bedømmes primært på plantebestanden/-tætheden af græs- og kløverplanter, men markens aktuelle "kondition" –
alder, ensartethed, spor m.v. spiller også ind.

Såfremt afgrøden er rent græs uden kløver, må pletter på størrelse med et fodaftryk eller en lille tallerken med tynd
plantebestand – eller helt uden planter – max. udgøre 5 % af det samlede areal i marken. Er der hvidkløver i marken, må dårl
pletter max. udgøre 10 % på nuværende tidspunkt.



Billede 1 Plantebestanden er for tynd, og selvom der er en pæn bestand af hvidkløver i marken, vil produktionen blive for ringe. En ældre mark som denne bør lægges om. (Foto: Thomas Harbo, SAGRO)

Isåning er en nødløsning, der ikke giver fuld produktion, men det kan være aktuelt i mindre områder, eller hvis græsprodukti "skal strækkes".

Mest aktuelt vil det være at reparere mindre pletter eller områder med tynd plantebestand i en i øvrigt god nyudlagt mark fr sidste år. Vil du i en sådan mark prøve med en reparation, der muligvis kan holde i flere sæsoner, skal du vælge at iså 15-20 k græsblanding. I ældre marker er udsigten til en succesfuld isåning noget mindre, men vil du på trods heraf prøve at øge græsmarkens produktion, skal du i sådanne marker iså 20-25 kg/ha af en hurtigvoksende græsart som italiensk rajgræs, rajsv af rajgræstypen eller evt. hybridrajgræs. Italiensk rajgræs holder kun denne sæson, mens hybridrajgræs og rajsvingel af rajgræstypen evt. også kan ligge til produktion næste år, hvis isåningen lykkes rigtig godt.

Tabel 2 Arter og udsædsmængde ved isåning

Isåning	Mængde (kg/ha)	Holdbarhed
Græsblanding	15-20	2-3 år
Rajsvingel af rajgræstypen Hybridrajgræs	20-25	2 år
Italiensk rajgræs	20-25	1 år

For at lykkes med isåning er rettidighed afgørende. Indsatsen skal foregå tidligt, så snart jorden er tjenlig. Dette er for at sikre isåede planter mest muligt lys og luft inden konkurrencen fra de etablerede planter bliver for stor, og jorden tørrer for mege

I førsteårsmarker på alm. lette jordtyper kan isåningen evt. ske med en alm. radsåmaskine, hvor såskærene strammes godt d der tromles efterfølgende. Generelt vil vi dog anbefale såmaskiner med rulleskær og trykrulle eller maskiner af "Väderstad-ty – på de sværere jordtyper er det nødvendigt for overhovedet at få frøene til at spire.

Etablering af græsmarker i renbestand

Af planterådgiver Thomas Harbo

I det helt tidlige forår kan du etablere græsmarker i renbestand.

Normalt udlægges den nye kløvergræsmark i dæksæd af ærter, vårbyg eller en blanding heraf, når den etableres i foråret. I d fleste tilfælde giver det gode og tætte græsmarker. I enkelte tilfælde ønskes der ikke en stak ensilage af en grøn- eller helsædsafgrøde, og da er etablering af græsmarken i renbestand en mulighed. Ulempen er dog i mange tilfælde et mindre udbytte, da græsset etablerer sig langsomt, og ikke har den samme store forårsvækst som de kraftigere korn- og ærteplante

En vellykket etablering fordrer tidlig såning, så det bør alene ske på høj, tidlig jord, fordi de svagtvoksende græs- og kløverpla skal bruge forholdsvis lang tid på at etablere sig og ikke har nogen stor konkurrenceevne overfor hurtigtvoksende ukrudtsart som pileurt-arter, fuglegræs og melde. Normalt anbefaler jeg ikke etablering i renbestand efter 1. april.

Efter gyllenedfældning og almindelig såbedstilberedning til græsmark rillesås græsfrøene i ½-1 cm dybde uden efterharve. An den anbefalede udsædsmængde for græsblandingen. Der skal også tromles, men det bør i de fleste tilfælde afvente, at kløve står med første trekoblede blad.

Gødskning ved etablering kan være 20-25 tons/ha gylle suppleret med 100-125 kg/ha N27; i alt ca. 75-80 kg N pr. ha. Når du gødsker de etablerede græsmarker efter første slæt, tildeler du igen 100-125 kg/ha N27, som skal forsyne afgrøden hen til sl som du kan tage sammen med det ordinære andet slæt. Herefter kan marken følges med de øvrige græsmarker til slæt.

Etablering af græsmarker i dæksæd

Af planterådgiver Thomas Harbo

De nye græsmarker etableres oftest i dæksæd til høst af en grønafgrøde eller helsæd.

Grønafgrøder og helsæd som dæksæd

Nye græs- og kløvergræsmarker etableres oftest i dæksæd. Det er som regel at foretrække frem for etablering i renbestand, markens samlede udbytte bliver større i udlægsåret.

Hvor det er et areal, "som altid ligger i græs", der skal lægges ud på ny, må det som udgangspunkt anbefales at lade dæksæd stå til helsædshøst, da det herved vil være muligt at holde marken i omdrift. Styrelse for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har fra 2026 ændret sin kategorisering af afgrøder, således at grønafgrøder puljes sammen med græs, så marken ikke blive defineret som omlagt, hvis dæksæden høstes som en grønafgrøde. På marker, hvor afgrøden skifter med års mellemru betyder det ikke det store, men på lavere arealer, der overvejende ligger i græs, kan det eksempelvis få betydning ved beregı af værditab eller éngangskompensation, hvis arealet skal indgå i et projekt i forbindelse med Grøn Trepart.

Som dæksæd anvendes oftest vårbyg eller blandinger af vårbyg og ærter. Ærter i renbestand, havre eller evt. vinterrug anver også i mindre omfang.

Udsædsmængde af dæksæden

Der er et stort spænd i udsædsmængden af dæksæd afhængig af præferencer, lokale forhold og tidspunkt. I tabellen neden ses de almindelig vejledende udsædsmængder. Som ved anden afgrødeetablering anvendes den laveste udsædsmængde ve tidlig etablering.

Tabel 3 Vejledende udsædsmængder.

Art	Anvendelse og udsædsmængde [kg/ha]	
	Grønafgrøde	Helsæd
Vårbyg	90-110	80-110
Havre	40 (afgræsning) / 40-60 (ensilering)	60
Vinterrug, hybrid	100-120 [1)] (afgræsning)	-
Ært	160-180	180
Byg/ært	40 + 120	60 + 120 eller 80 + 80 [2)]

1) Lavest udsædsmængde anvendes, hvor der etableres kløvergræs, mens den højere udsædsmængde anvendes, hvor der i italiensk rajgræs.

2) Hvor, der er erfaring eller risiko for, at dæksæden bliver meget kraftig med tendens til lejesæd, anvendes gerne blandinge + 80 kg/ha, for at reducere risikoen for lejesæd.

Isåning af urter og ukrudtsbekæmpelse

Iblanding af forskellige urter som kommen, cikorie og lancet vejbred m.fl. har fået en vis udbredelse pga. Arlas afregningsmo Urterne tåler generelt ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse med bentazon-midler som Basagran SG og Fighter 480. Udlægsbland med urter er derfor mest egnede til etablering i renbestand eller med en grønafgrøde som dæksæd, hvor vi oftest kan undla ukrudtsbekæmpelsen.

Etablering af hestebønner og ærter

Af planterådgiver Peter Siebert

Tidlig etablering af hestebønner og ærter er at foretrække og bør prioriteres før etablering af vårkorn. Fokus skal vær at så ensartet i en dybde af 6-8 cm for ærter og 6-9 cm for hestebønner.

Hjemmedyrkede proteinafgrøder har fået øget opmærksomhed i de senere år som en kilde til hjemmeavlet protein; særligt e arealet med hestebønner blevet øget. Husk at hestebønner er en meget vandkrævende afgrøde og derfor kun bør dyrkes på som har en god vandforsyning, enten i form af en god vandforsynende jordtype, eller hvor der er mulighed for vanding. Hestebønner og ærter er selvforsynende med kvælstof og har kun behov for tilførsel af fosfor og kalium; i mange tilfælde kar behovet opfyldes af 350-450 kg/ha PKS 0-4-21 placeret eller tilsvarende.

Den største ændring til denne sæson er, at Fighter 480 er på vej ud og ikke længere markedsført jf. oplysninger fra middeldatabasen.dk. Afløseren til Fighter 480 er Basagran SG, som indeholder samme aktivstof (Bentazon), dog i en noget m koncentreret udgave med 870 g aktivstof mod 480 g aktivstof i Fighter 480. Derudover er Basagran SG ikke flydende men et vandopløseligt granulat. Læs altid etiketten inden brug og ved tvivl slå midlet op i middeldatabasen.dk eller i kemitjek app'en

Sådybde, udsædsmængde og ukrudtsbekæmpelse

Bælgsæd som hestebønner og ærter skal sås, så snart jorden er tjenlig. Hestebønner bør ideelt sås fra nu og frem til midten marts. Den tidlige såning har flere formål, blandt andet sikres det, at afgrøden modner tidligere og høstbesvær mindskes, da vejret ofte er bedre, jo tidligere afgrøden, er klar til høst. Ydermere resulterer den tidlige såning og langsommere fremspiring ukrudtsbekæmpelsen bliver lettere, da der er flere sikre løsninger før afgrødens fremspiring. Fælles for hestebønner og ærte

at de skal sås dybt, hhv. 6-9 cm's dybde for hestebønner og 6-8 cm's dybde for ærter. For hestebønner skal sådybden være d i pløjet eller dybdeharvet jord. Det kræver et godt forarbejde og korrekt indstilling af såmaskinen samt for de fleste såmaskir vedkommende også en tilpas lav fremkørselshastighed, som ikke bør overstige 5 km/t.

Udsædsmængden er afhængig af tusindkornsvægten (TKV) som for hestebønner og ærter kan variere meget. Udsæden er dy det er vigtigt at ramme den rigtige udsædsmængde. Den vejledende udsædsmængde bestemmes af det ønskede plantetal, h det vejledende plantetal for hestebønner er 35-40 planter pr. m^2. For ærter er det vejledende plantal 50-70 planter pr. m^2, st plantetal anvendes ved småfrøede sorter. For ærter til helsæd i blanding med vårbyg tilstræbes 50-55 planter pr. m^2 samme med 60-80 kg vårbyg pr. ha.

Udsædsmængden beregnes efter nedenstående formel.

$$Udsæd\ i\ kg\ pr.ha = \frac{\text{Ønsket planter pr. m2} * \text{TKV}}{Procent\ markspiring}$$

I tabellen nedenfor kan du også aflæse den vejledende udsædsmængde ved 85 % markspiring.

Tabel 4 Vejledende udsædsmængde i kg/ha for ærter og hestebønner ved markspiringsprocent på 85.

Ærter [Planter/m^2]						Hestebønner [Planter/m^2]			
TKV	50	55	60	65	70	**TKV**	35	40	45
200	118	129	141	153	165	**500**	206	235	265
225	132	146	159	172	185	**550**	226	259	291
250	147	162	176	191	206	**600**	247	282	318
275	162	178	194	210	226	**650**	268	306	344
300	176	194	212	229	247	**700**	288	329	371

En vellykket etablering og en effektiv ukrudtsbekæmpelse er et solidt udgangspunkt for et tilfredsstillende udbytte og en god nem høst af afgrøden. I såvel ærter som hestebønner er det muligt at bruge jordmidlet Fenix, som har en god effekt på flere ukrudtsarter. Fenix må i hestebønner kun anvendes før fremspiring af afgrøden. En god og prisfornuftig ukrudtsløsning i hestebønner er en blanding af Fenix og et glyphosatmiddel; anvend f.eks. 0,75 L/ha Fenix + 540 g/ha aktivstof glyphosat. Anvendelse af et glyphosatprodukt er kun aktuelt, hvis der på sprøjtetidspunktet er fremspiret ukrudt. Hvis ukrudtet endnu i er fremspiret, opnås der ingen effekt af en glyphosatsprøjtning.

I ærter kan Fenix også anvendes efter fremspiring, og her kan en blanding af Fenix og Basagran SG/Fighter 480 bruges, når d første kimblade på ukrudtet er fremme. Anvend f.eks. 0,5 L/ha Fenix + 0,22 kg/ha Basagran SG (0,4 L/ha Fighter 480). Anvend penetreringsolie sammen med Fenix + Basagran SG/Fighter 480.

Ukrudtsbekæmpelse i ærter med kløvergræsudlæg

Bemærk, at Fenix **ikke** kan anvendes, når der samtidig er etableret kløvergræsudlæg. Ved udlæg af kløvergræsudlæg i ærter modenhed eller i ærter til helsæd anvendes kun Basagran SG/Fighter 480. Bemærk, at Fenix har en lang behandlingsfrister p dage før høst, som skal overholdes. Er du derfor i tvivl om, hvorvidt afgrøden skal anvendes til helsæd eller modenhed, bør d læse etiketten nøje og sikre dig, at du ikke overskrider behandlingsfristen.

Der er generelt megen vigtig information på sprøjtemidlernes etiket, og du bør altid læse denne inden brug.

Flere har fået interesse i at etablere græsmarker med iblanding af urter efter at det i Arla´s pointsystem kan give en merbeta for iblanding af urter. Vi gør opmærksom på, at de fleste af de markedsførte urter ikke tåler kemisk ukrudtsbekæmpelse sær godt, og at det derfor ikke anbefales at bruge kemisk ukrudtsbekæmpelse, når græsudlægget er med iblanding af urter.

Du kan finde yderligere informationer om dyrkning af hestebønne og markært i SEGES' dyrkningsvejledninger, som du finder

Nitrifikationshæmmer i gylle til græs

Af planterådgiver Peter Siebert

Brug af nitrifikationshæmmer i græs har i et enkelt forsøg i 2025 ikke givet et merudbytte. Anbefaling fra tidligere gæl stadig og det kan være aktuelt at bruge nitrifikationshæmmer i gylle til græs ved meget tidlig udbringning.

I Tilvækst Grovfoder nr. 1 udgav vi en artikel vedrørende brug af nitrifikationshæmmer i gylle ved tidlig gylleudbringning. I de korte artikel bringer vi konklusion af et forsøg fra 2025, hvor brugen af nitrifikationshæmmer i græs er blevet afprøvet. Forsøgsledet med afprøvning af nitrifikationshæmmer i gylle til græs indgår i et forsøg med afprøvning af forskellige teknikke gylleudbringning i kombination med tilsætning af enten svovlsyre eller nitrifikationshæmmer, eller en kombination af begge. Konklusionen fra forsøget er, at der er ikke noget merudbytte for anvendelse af nitrifikationshæmmer i gylle til græs i dette forsøg. Det er dog altid lidt forsimplet at drage de helt store konklusioner på baggrund af et enkelt forsøg i et enkelt givent vækstår. 2025 var et forholdsvist tørt vækstår, og det må derfor også forventes at nitrifikationshæmmeren ikke har haft de b forudsætninger for at give den helt store effekt, da effekten skal findes i at undgå udvaskning af nitratkvælstof.

Vores anbefaling fra Tilvækst grovfoder nr. 1 står derfor uændret. Du kan i nedenstående uddrag se anbefalingen fra den oprindelige artikel. Du kan finde den fulde artikel ved at tilgå dette link til Tilvækst Grovfoder nr. 1 (https://publikationer.sagro.dk/tilvaekst-grovfoder-2026/tilvaekst-grovfoder-nr-1-29-januar-2026/#:~:text=Til%20toppen-,Brug%20nitrifikationsh%C3%A6mmer%20ved%20tidlig%20gylleudbringning,-Af%20planter%C3%A5dgiver%20Peter).

De officielle anbefalinger vedrørende brug af nitrifikationshæmmer er, at de primært skal anvendes i rækkeafgrøder, som ha langsom etablering. **Imidlertid vil vi udvide anbefalingen til flg.:**

- Græsmarker, vårsæd, korn og blandsæd
  - Februar måned, meget tidlig udbringning af gylle
- **Majs og foderroer - ALTID**
  - Februar til medio april

Gylleanalyser 2026

Kilde: TILVÆKST Salgsafgrøder

Med foråret kommer også tiden for gylleanalyser. Prøverne kan enten udtages af en omrørt tank, eller Eurofins kan u prøven via stangmetode, hvor de udtager prøven af uomrørte tanke.

Udtagning af gylleprøver fra omrørte tanke

Når gyllen i en tank er grundigt omrørt, kan du udtage en gylleprøve og få analyseret indholdet af næringsstoffer. Du kan væ mellem forskellige analysetyper. Typer og priser fremgår af tabel 5.

Tabel 5 Priser på forskellige typer af gylleanalyser og tilvalg, som tilbydes hos SAGRO. Priserne er inkl. bestilling, emballage, forsendelse og udsendelse af analyseresultater.

Kode	Analysetype	Pris, inkl. emballage og forsendelse
G1	TS, TotN, NH_4-N, P, K	770 kr.
G2	TS, TotN, NH_4-N, P, K, Mg, Cu	975 kr.
G3	TS, TotN, NH_4-N	730 kr.
GN	TotN, NH_4-N	695 kr.
Tilvalg		
	Klorid	+ 395 kr.
	Svovl	+ 185 kr.
	Reaktionstal pH	+ 205 kr.
	Eurofins udtagning af uomrørt tank	+ 615 kr.

SAGRO benytter Eurofins laboratoriet til gylleanalyser. Gylleprøven afleveres i autoriseret emballage. Emballage udleveres i a rådgivningshuse. Eurofins er et akkrediteret laboratorium, hvilket er nødvendigt for at gylleanalyser kan anvendes i præcisionsjordbrug, som et alternativ til efterafgrøder.

Indlevering af gylleprøver

Ved Eurofins findes flere muligheder for forsendelse. Rådgiveren kan sørge for emballagen; enten får du den med hjem fra rådgivningshuset, eller du får den tilsendt, og du sørger selv for forsendelse til laboratoriet. Forsendelsen er betalt af SAGRO inkluderet i prisen, også når du selv indsender. Det er også muligt at indlevere gylleprøven i godkendt emballage til rådgivningshuset, hvorefter SAGRO sender den til laboratoriet.

Udtagning af gylleprøver fra ikke omrørte tanke

Det er professionelle prøveudtagere fra Eurofins, som udtager prøven. Bestilling sker stadigvæk igennem din planterådgiver, få nu bestilt i god tid. Det koster et tillæg på 615 kr. pr. prøve at få udtaget prøverne fra uomrørte tanke. Se de øvrige priser o analysetyper i tabel 5.

REGLER OG TILSKUD

Sprøjtejournal – kom godt i gang

Af planterådgiver Vivi Ernstsen

Sprøjtejournalen skal føres umiddelbart efter endt sprøjtning. Bliv klar, så det er nemt i sæsonen.

Inden foråret for alvor sætter ind, er det nu et godt tidspunkt at forberede den kommende sprøjtesæson med hensyn til registrering:

- Hvilke oplysninger skal indgå i sprøjtejournalen?
- Hvilke midler er på lager, og er midlerne godkendte?
- Orientere sig om hvilke midler, som kun må anvendes i få vækststadier

Kravene til en fyldt udfyldt sprøjtejournal er steget i årernes løb. Derfor kan det på det kraftigste anbefales at anvende et elektronisk hjælpemiddel som f.eks. app'en FarmTracking. I FarmTracking hjælper programmet til hvilke felter, der skal udfyl Hvis det er korrekt indtastet i MarkOnline med afstandkrav til veje, boliger, offentlige arealer m.m. kan FarmTracking beregn hvor stort det behandlede areal må være. På nuværende tidspunkt er der ikke et kortlag, hvor vi kan se ovenstående afstandskrav. Er du i tvivl om der i samarbejde med din planterådgiver er lagt afstandskrav i planen, bør du kontakte din planterådgiver.

FarmTracking koster 1.350 kr. i oprettelse + et årligt abonnement mellem 2.300-5.000 kr. - afhængig af bedriftsstørrelse. Har aftale med maskinstation om at udføre sprøjtearbejde og indtastning kan datadelingsabonnement købes for 495 kr./sæson/datadeling.

Alternativt kan SAGRO hjælpe med indtastning af sprøjteoplysninger i sæsonen. Læs mere om sprøjtejournal-abonnement h (https://www.sagro.dk/landbrugsradgivning/planter/sprojtejournal-abonnement)

Oplysninger i sprøjtejournalen

Følgende oplysninger skal sprøjtejournalen indeholde:

- Entydig identifikation af marken/arealet (marknummer/markID, som skal være identisk med det ID, der er anført i fællesskemaet).
- Afgrøde eller kultur som er angivet på etiketten for det godkendte plantebeskyttelsesmiddel og/eller som indgår i Miljøstyrelsens afgrødeliste.
- Marken/arealets samlede areal i hektar med to decimaler eller m^2.
- **Afgrødens vækststadie ifølge BBCH-skalaen (ved krav på produktets etikette).**
- Angivelse af anvendt plantebeskyttelsesmiddel med fulde navn og registreringsnummer.
- Anvendt dosering.
- Dato for anvendelse.
- Behandlet areal (nettoareal).
- **For plantebeskyttelsesmidler med 'bimærke' skal der ved behandling i blomstrende afgrøder angives starttidspu for sprøjtningen (hele time).**
- Ejer eller brugers CVR-nummer samt CVR-nummer for den bruger/virksomhed, som udfører sprøjtningen, hvis sidstnæ er forskellig fra ejer/bruger.
- Dokumentation for brug af afdriftsreducerende dyser ved reduktion i afstandskrav og ved brug af pesticider med krav brug af afdriftsreducerende udstyr i hele marken, f.eks. produkter med indhold af prosulfocarb (dokumentation heraf behøver ikke være en del af sprøjtejournalen).

Som en del af kravene skal vækststadiet for afgrøden på sprøjtetidspunktet angives. Anvendes midler med bimærke, skal starttidspunktet i hele timer angives. Fremadrettet kommer yderligere krav til digital sprøjtejournal, hvilket vi vil skrive nærm om, når det bliver aktuelt.

Lagerbeholdning

Lagerbeholdningen af planteværn bør som minimum tjekkes to gange om året. Midler, som er modtaget denne sæson bør o tjekkes. Med KemiTjek fra SEGES kan du nemt via app'en scanne stregkoderne på midlerne, hvorefter app'en vil kontrollere, midlet er godkendt eller ej via farvekoder:

- Grønt lys: Midlet er lovligt at bruge og opbevare.
- Gult/lyserødt lys: Midlet er på vej ud af markedet. Læs etiketten, om midlet kan anvendes før udløb, samt hvilke afgrø midlet er godkendt til.
- Mørkerødt lys: Midlet er forbudt. Kør straks til kommunens genbrugsordning for at aflevere produktet.

KemiTjek koster 495 kr./år og kan hentes i app-store/playbutik. Kontakt SEGES på 7015 5015 # 3 og bliv tilmeldt.

Sprøjtearbejdet udført af anden part – husk dokumentation

Af planterådgiver Vivi Ernstsen

Styrelsen har strammet kravene til hvem, som skal have dokumentation med sprøjteoplysninger direkte tilgængeligt på kontroltidspunktet. Sprøjteoplysningerne skal altid være tilgængelige og ajourført på bedriften. Udfører en anden part sprøjtearbejdet, skal sprøjteoplysningerne fremsendes umiddelbart efter kontrol – og den udførende part skal også have en liggende. Tidligere har sprøjteoplysninger skulle være opdateret indenfor syv dage – DET ER IKKE LÆNGERE GÆLDENDE.

Flydende ammoniak må fortsat anvendes

Af Kilde: SEGES

I 2024 kom godkendelsen til, at flydende ammoniak må anvendes til gødningsformål - dog med en række retningslinjer for anvendelsen.

Tabel 6 Flydende ammoniak, krav til nedfældningsdybde og dosering.

Nedfældningsdybde [cm]	Max. dosis [kg pr. ha]
5	29
10	59
15	89
20	118

Rent praktisk skal slutbruger modtage en erklæring fra leverandøren, hvoraf det fremgår, at flydende ammoniak er tilladt at anvende.

DAKOFO gør opmærksom på, at ansvar for overholdelse af dosering af flydende ammoniak alene er brugerens eget ansvar. Miljøstyrelsen er resort for overholdelse af REACH-forordningen i Danmark. I forbindelse med DAKOFOs notifikation via ECHA Miljøstyrelsen besked om ændring af anvendelsen. Det betyder, at Miljøstyrelsen kan stille spørgsmål ved beregningerne i eksponeringsscenariet og deraf dosering mm.

DAKOFO ligger inde med en faglig rapport, der grundigt beskriver argumentationen for forudsætningerne i beregningerne. DAKOFO kan dog ikke drages til ansvar, hvis forudsætningerne for beregningerne i eksponeringsscenarie falder bort.